

CONSORZIO
VINI VENEZIA

TRE TERRITORI ALL'OMBRA DEL LEONE

VADEMECUM VITICOLO

13^a EDIZIONE 2025

SOSTENIBILITA' NELLA PRODUZIONE INTEGRATA DEL VIGNETO
Sustainability in the integrated vineyard management





Continua la proficua cooperazione tra il Consorzio Vini Venezia ed il Consorzio di Tutela della DOC Prosecco nel redigere per il tredicesimo anno consecutivo, il vademecum vitivinicolo - campagna 2025. La sostenibilità ambientale, sociale ed economica, inizia ad essere parte integrate della gestione delle nostre Denominazioni. Tutti noi siamo responsabili dell'impatto che abbiamo sul territorio - e sulla società - in cui viviamo, che amiamo, che vogliamo e dobbiamo tutelare. Stiamo lavorando intensamente per sviluppare un sistema di gestione per la sostenibilità che possa trasferire alla filiera i contenuti applicativi per il raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati: la riduzione degli input chimici, il mantenimento/incremento della fertilità del suolo, la salvaguardia delle risorse idrica e della biodiversità. Il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse sarà funzionale a tale sistema di gestione, permettendoci di identificare le strategie e le aree prioritarie di intervento anche in ambito etico e sociale, tra cui la tutela dei lavoratori, la gestione e la crescita delle competenze aziendali ed il dialogo con la comunità.

Il vademecum, in coerenza con il principio di salvaguardia del territorio, è uno strumento agevole e concreto per pianificare al meglio la difesa del vigneto, indicando le pratiche ed i prodotti maggiormente adeguati. Considerando la vostra sensibilità verso il tema ambientale e sociale - con uno sguardo consapevole a non compromettere quello economico - siamo certi che questo approccio condiviso di miglioramento continuo del processo produttivo porterà a salvaguardare il valore delle nostre denominazioni, le quali, con il vostro custodire il territorio, diventerebbero esempi virtuosi per tutta la viticoltura nazionale e mondiale. Buon lavoro

Consorzio Vini Venezia and Consorzio Prosecco DOC continue, for the 13th consecutive year, to collaborate successfully on the grapevine grower guide (vademecum viticolo) – season 2025. Environmental-, economic- and social sustainability is now an integral part of our Appellation management. All of us are responsible for the impacts we have on the territory - and the society - we live in, we love, we want - and must - protect. We are working intensively to implement a Sustainability Management System (SMS) that will allow us to develop, and transfer to the productive system operators, the application contents functional to the achievement of sustainable development targets. The environmental targets are related to the reduction of chemical inputs, improvement of soil fertility, water stewardship and the protection of biodiversity. Moreover, the stakeholders' engagement is a key aspect of the SMS, allowing us to identify strategies and prioritizing the actions needed also on the ethical and social sphere, like employee- and people well-being, skills improvement, and active dialogue with the communities.

This grower guide, in agreement with the principles of land stewardship, is a practical tool that will help you plan your vineyard defense strategy through the indication of the most adequate phytosanitary products and cultural practices. Considering your level of professionalism and sensitivity in regards to environmental and social aspects – with a conscious eye at the economical ones – we are confident that a shared approach, based on the constant improvement of the productive processes, will benefit the value of our wine regions and becoming a virtuous example for the viticulture at both national and global level. Keep up with the good work!

Giancarlo Guidolin
Presidente
Consorzio Tutela Prosecco DOC

Giorgio Piazza
Presidente
Consorzio Vini Venezia

IL VADEMECUM VITICOLO - Fiorello Terzariol

Il VADEMECUM VITICOLO è basato prioritariamente sulle indicazioni emanate dai **Disciplinari di Produzione Integrata** della Regione **Veneto** anno **2025** e del **Friuli Venezia Giulia** (per il Prosecco DOC), che dettano le norme, i mezzi e i metodi atti ad una produzione agroalimentare sostenibile, ottenuta con il minimo utilizzo delle sostanze chimiche di sintesi, con la razionalizzazione delle tecniche agronomiche, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

In aggiunta a tali riferimenti, si fa presente una ulteriore limitazione del Vademecum su alcune sostanze attive, anche se ammesse dal Ministero competente i Consorzi di Tutela Prosecco DOC e Vini Venezia, hanno deciso volontariamente di sconsigliarne l'uso.

Si è evidenziato cromaticamente e in sequenza preferenziale a minor impatto, le varie sostanze attive, prediligendo quelle in fascia verde, poi gialla ed infine (in assenza di alternative meno impattanti) in fascia arancione. Tutto ciò determinato dalle attuali formulazioni commerciali che possono appartenere, anche con la medesima sostanza attiva a differenti classi tossicologiche e a differenti frasi di pericolo H (da Hazard pericolo in inglese) dall'1 giugno 2017, che possono comportare effetti nocivi acuti e/o cronici sull'uomo (...operatore).

L'elenco dei prodotti commerciali riportato nel VADEMECUM ha valore puramente indicativo e pertanto non comprende (talvolta), tutti i **formulati** autorizzati dal Ministero della Sanità presenti sul mercato (alcuni sono in attesa di autorizzazione e comunque saranno **aggiornati puntualmente nel sito dei presenti Consorzi sulle nuove formulazioni eventualmente ammesse o revocate**) e tutti gli obblighi (adesione ai vari sistemi di qualità proposti nel territorio), anche agronomici, presenti nei Disciplinari di

Produzione Integrata del Veneto e/o del Friuli Venezia Giulia.

Attenzione alle eventuali sostanze attive riportate nel presente documento, ma che non sono ammesse (Import Tolerance) nei vini esportati nel resto della UE, negli USA, o in altri Paesi.

Dal lato legislativo i Prodotti Fitosanitari hanno percorso diverse strade negli ultimi anni: Regolamento CE n.1107/2009 (autorizzazione all'immissione in commercio dei fitofarmaci); Direttiva CE n.128/2009 (uso sostenibile dei prodotti fitosanitari); Decreto Legislativo n.150 del 14 agosto 2012 (recepimento dell'Italia della direttiva CE 128/2009); Decreto (Ministero delle Politiche Agricole di concerto con il Ministero dell'Ambiente e del Ministero della Salute) del 22 gennaio 2014 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato dal PAN, in attesa della imminente nuova versione (Decreto) del Piano di Azione Nazionale.

Si evidenzia che l'utilizzo dei Prodotti Fitosanitari, oltre che dal buon senso, deve sempre avere il massimo dell'attenzione nei confronti di quanto è riportato nell'**ETICHETTA** (che corrisponde a **LEGGE!**), e il rispetto delle Buone condizioni agronomiche e ambientali e dei Criteri di gestione obbligatoria di quanto prevede la **CONDIZIONALITA'** (in primis Reg. CE 1782/2003 e 1306/2013) e ora "rafforzata" dal 2023 (CG07 e CG08): patentino per l'acquisto dei Prodotti Fitosanitari, dispositivi di protezione individuale, sito idoneo per lo stoccaggio dei PF, controlli e taratura macchine, compilazione del registro dei trattamenti...!)

Si ricorda infine, che l'azienda viticola è obbligata a seguire le indicazioni emanate da eventuali regolamenti/ordinanze comunali e/o certificazioni/protocolli/manuali viticoli più restrittivi, rispetto al presente documento.

PRODOTTI FITOSANITARI: criteri di valutazione adottati

Nel rispetto dei principi della difesa integrata, la scelta delle sostanze attive/prodotti fitosanitari, nelle singole norme di coltura e sulle singole avversità, è stata effettuata tenendo conto della disponibilità di valide alternative ai fini di poter applicare adeguate strategie di difesa. Sono stati limitati, per quando possibile, i prodotti (miscele, così come definite dalla classificazione CLP) che:

- contengono sostanze attive “candidate alla sostituzione” allegato E del Regolamento (UE) n 540/2011;
- sono caratterizzati da elevata tossicità acuta: presenza sull’etichetta del simbolo di pericolo o pittogramma “teschio con tibie incrociate” (corrispondenza al pittogramma GHS06);
- CMR (sospette per effetti cronici di tipo Cancerogeno, Mutageno ed effetti tossici per la Riproduzione)
- contengono sostanze attive classificate pericolose per l’ambiente acquatico (LGS N. 152/06, tabelle 1A e 1B) e Direttiva Acque 2000/60/CE .
- sono indicate dal FRAC, IRAC e HRAC (resistenze).

CLP: scelte limitate per i prodotti con frasi di pericolo (H) su effetti cronici sull’uomo:

H340 – H341 - H350i – H351 – H360 – H360D - H360Df – H360FD – H360Fd – H361fd

Classificazione dei prodotti fitosanitari indicati nel Vademecum

PREFERIBILE

ATTENZIONE

USO LIMITATO

FASI FENOLOGICHE

A



**gemma
cotonosa**

**BBCH
05**

B



germogliamento

**BBCH
11**

C



foglie distese

**BBCH
15**

D



**differenziazione
grappolini**

**BBCH
53**

E



pre fioritura

**BBCH
60**

F



fioritura

**BBCH
65**

G



allegagione

**BBCH
71**

H



**prechiusura
grappolo**

**BBCH
75**

I



invaitura

**BBCH
83**

L



maturazione

**BBCH
89**

PERONOSPORA (Plasmopara viticola)

Sostanza attiva	Fase	Prodotti commerciali
Fosfonato di potassio	C - H	CENTURY SL - ALEXIN 75 LS
Fosfonato di disodio	C - H	QUARTET
Laminarina	H - L	VACCIPLANT
Cerevisane	C - H	ROMEO
Olio essenziale di arancio dolce	C - H	PREV-AM PLUS - LIMOCIDE - ORO QUIN
Dithianon (1)*	C - F	DELAN PRO (con Fosfonato di K) - ENVITA
Fluazinam (1)*	F - H	ZIGNAL-ecc.
Fosetil Al	C - H	ALFIL-ELIOS-OPTIX-MOMENTUM-ALIETTE-ecc.
Dimetomorph	E - H	FILDER-FORUM-QUANTUM-ecc.
Mandipropamide (2)	E - H	PERGADO (varie miscele) - AMPEXIO
Cimoxanil	D - G	CURAME-LIETO-ecc.
Pyraclostrobin (3)	D - G	REGNUM 25 EC - TUCANA 25 EC
Fluopicolide	C - G	PROFILER
Metalaxil-M (4)	E - G	RIDOMIL-GOLD R-FLARE -ecc.
Amisulbrom (5)	E - G	LEIMAY-GENKOTSU
Cyazofamid (5)+Fosfonato di disodio	E - G	MILDICUT
Zoxamide	G - I	ZOXIUM-MOVIDA-ecc.
Ametoctradina	D - H	ENERVIN SC
Oxathiapiprolin	E - G	ZORVEC VINABRIA - ORONDIS FORTE
Folpet (1)*	C - G	FOLPAN-FOLIANE SC-FOLDER-ecc.
Valifenalate (2)	E - H	VALIS F
Benalaxil M (4)	E - G	FANTIC F
Rameici	C - I	IPERION-AIRONE-NEORAM-CUPRAVIT-ecc.

PREFERIBILE

ATTENZIONE

USO LIMITATO

Limitazioni d'uso annuo	BIO
max 8 con Fosetil Al e Fosfonati (esclusi allevamenti)	
max 8 con Fosetil Al e Fosfonati (esclusi allevamenti)	
Induttore di resistenza	  
max 12 interventi complessivi (attenzione limiti etichetta)	
max 12 interventi complessivi (attenzione limiti etichetta)	
max 8 con Fosetil Al e Fosfonati (esclusi allevamenti)	
max 2 interventi [revocato: utilizzo entro 20.05.2025]	
(2) CAA: max 4 in alternativa tra loro	
max 4 trattamenti Veneto - 3 Friuli VG	
(3) QoL: max 3 all'anno in totale (vedi Oidio)	
max 2 interventi	
(4) max 2 interventi all'anno in Veneto - 3 in Friuli VG	
(5) max 3 interventi in alternativa tra loro	
(5) max 3 interventi in alternativa tra loro	
max 4 trattamenti Veneto - 2 Friuli VG	
max 3 trattamenti	
max 2 interventi Veneto - 1 Friuli VG	
(1) max 12 interventi complessivi (attenzione limiti etichetta)	
(2) CAA: max 4 in alternativa tra loro	
(4) max 3 trattamenti in alternativa tra loro	
max 28 Kg ettaro di rame metallo anno in 7 anni	



Attenzione, note aggiuntive:

- (1)* N° 12 trattamenti complessivi, indipendentemente dalle avversità. In particolare, sempre nel rispetto delle indicazioni presenti in etichetta, si raccomanda di non superare i 6 interventi complessivi per singola sostanza attiva (1).
- Visto le revocche che hanno interessato i prodotti ad azione multisito, al fine di ridurre i rischi di far insorgere resistenze alle sostanze, si raccomanda di definire adeguatamente la strategia di difesa, prevedendo l'utilizzo dei prodotti ad azione monosito abbinati con i principi attivi ad azione multisito (Rameici, Folpet, Dithianon) e (Fluazinam) rimasti a disposizione.

OIDIO (*Uncinula necator*-*Oidium tuckeri*)


Sostanza attiva	Fase	Prodotti commerciali
Ampelomyces quisqualis	A - F	AQ 10 WG
Zolfo	A - L	TIOVIT-KUMULUS-THIOPRON-TIOLENE-ecc.
Olio essenziale di arancio dolce	C - H	PREV-AM PLUS - LIMOCIDE
Laminarina	H - L	VACCIPLANT
Bacillus pumilus	C - L	SONATA
Cerevisane	C - H	ROMEO
Bicarbonato di potassio	C - I	ARMICARB 85-VITIKAPPA
Terpeni (Timolo, Geraniolo, Eugenolo)	F - L	3LOGY
Bacillus amyloliquefaciens	D - I	TAEGR0
COS-OGA	B - I	IBISCO
Bupirimate (6)	E - G	NIMROD 250 EW
Azoxystrobin (3)	C - G	QUADRIS
Trifloxystrobin (3)	E - G	FLINT
Pyraclostrobin (3)	E - G	TUCANA 25 EC-REGNUM 25 EC
Difenoconazolo (4)	E - G	SCORE 25EC-MAVITA 250 EC-ecc.
Penconazolo (2)	E - G	TOPAS-RADAR-PELER
Mefentrifluconazolo (2)	E - G	REVISION
Tetraconazolo (2)	E - G	DOMARK-CONCORDE-EMERALD-ecc.
Spiroxamina	B - F	PROSPER 300 CS
Metrafenone (1)	E - G	VIVANDO-NABUCCO
Boscalid (5)	H - I	CANTUS
Meptyl Dinocap	A - F	KARATHANE STAR
Proquinazid (6)	G - I	TALENDO
Cyflufenamide	E - G	CIDELY-REBEL TOP
Pyriofenone (6)	F - H	KUSABI
Fluxapyroxad (5)	D - G	SERCADIS

PREFERIBILE

ATTENZIONE

USO LIMITATO

Limitazioni d'uso annuo	BIO
	🐞
	🐞
	🐞
	🐞
	🐞
Induttore di resistenza	🐞
max 8 in Friuli	🐞
max 4 trattamenti in Veneto	🐞
anche antibotritico	🐞
	🐞
(3) QoI: max 3 in totale *	
(4) max 1 trattamento all'anno	
(2) IBE: max 3 in totale *	
max 3 interventi all'anno	
(1) max 3, compreso uso del Pyriofenone	
(5) max 1 indipendentemente avversità	
max 2 trattamenti all'anno [revoca: utilizzo entro 30-09-2026]	
max 2 trattamenti all'anno	
(6) max 2 trattamenti complessivamente	
(5) max 2 interventi all'anno	



Intervenire alternando prodotti sistemici e di copertura in funzione della pressione della malattia e tenuto conto delle fasi più critiche.
 (5) Max 2 interventi/anno con SDHI: max 1 con Boscalid, max 2 con Fluxapyroxad.

* Numero trattamenti indipendentemente dall' avversità.

BOTRITE (*Botrytis cinerea*)

Sostanza attiva	Fase	Prodotti commerciali
<i>Aureobasidium pullulans</i>	H - I	BOTECTOR NEW
<i>Bacillus subtilis</i>	H - I	SERENADE AS0
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	H - I	AMYLO X-SERIFEL
Bicarbonato di potassio	F - I	ARMICARB 85
Cerevisane	C - H	ROMEO
Laminarina	H - L	VACCIPLANT
<i>Pythium oligandrum</i> ceppo M1	G - L	POLYVERSUM
<i>Trichoderma atroviride</i> ceppo SC1	G - L	VINTEC
<i>Metschnikowia fructicola</i>	G - L	NOLI
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	G - L	SWOOSH
<i>Trichoderma asperellum</i> - <i>T. gamsii</i>	A - A	REMEDIER-TELLUS WP
Fenexamid	H - I	TELDOR PLUS
Boscalid	H - I	CANTUS
Isofetamid	G - I	KENJA
Pyrimetanil	H - I	SCALA-PAPYRUS-BREZZA-ecc.
Terpeni (Timolo, Geraniolo, Eugenolo)	F - L	3LOGY
Ciprodinil	H - I	MARQUIS-QUALY-TARLYS
Fludioxonil	H - I	GEOXE
Fluazinam	H - I	BANJO-ecc.
Fenpyrazamine	H - I	PROLECTUS 50 WG

PREFERIBILE

ATTENZIONE

USO LIMITATO

Limitazioni d'uso annuo	BIO
	
efficace su marciume acido	
efficace su marciume acido	
	
Induttore di resistenza	
	
efficace su marciume acido	
	
	
	
vedi Mal dell'esca	
max 2 trattamento	
max 1 indipendentemente avversità	
max 1 trattamento	
max 1 trattamento	
max 4 trattamenti	
max 1 trattamento	
max 1 trattamento	
vedi Peronospora	
max 2 trattamento	
	(revoca 15.01.2026)



Interventi agronomici: scelta di idonee forme di allevamento; equilibrate concimazioni e irrigazioni; carichi vegeto produttivi equilibrati.

Difesa chimica: max 2 trattamenti, preferendo comunque l'intervento in fioritura-prechiusura del grappolo;

Nella fase di invaiatura e preraccolta utilizzare prodotti non di sintesi.

ESCORIOSI (*Phomopsis viticola*)

Sostanza attiva	Fase	Prodotti commerciali
Pyraclostrobin	A	REGNUM 25 EC
Dithianon + Fosfonato di K	A	DELAN PRO
Folpet	A	FOLPAN - ecc.
Rameici	A	CUPRAVIT - AIRONE - ecc.
Azoxystrobin	A	QUADRIS
Zolfo	A	TIOVIT - KUMULUS - ecc.
PREFERIBILE	ATTENZIONE	USO LIMITATO

MAL DELL'ESCA (*Phaeomoniella chlamydospora-Fomitiponia mediterranea-Phaeo*)

Sostanza attiva	Fase	Prodotti commerciali
Trichoderma asperellum-T. gamsii	Pianto	REMEDIER-TELLUS WP
Trichoderma atroviride	Pianto	VINTEC-ESQUIVE WP
Boscalid+Pyraclostrobin	Pianto	TESSIOR

PREFERIBILE	ATTENZIONE	USO LIMITATO
-------------	------------	--------------

Limitazioni d'uso annuo

vedi note Peronospora / Oidio

vedi note Peronospora

vedi note Peronospora

vedi note Peronospora

vedi note Oidio

NO Veneto



Intervenire a gemma mossa o punta verde nei vigneti che negli anni precedenti hanno evidenziato la presenza del fungo.

cremonium aleophilum)

Limitazioni d'uso annuo

BIO

distanziare 6-7 giorni da un fungicida



trattare al bruno sui tagli di potatura



non rientra nel cumulo SDHI e QoI



Interventi agronomici: in caso di piante fortemente attaccate procedere all'estirpazione. In caso di piante infette solo in parte, asportare le parti invase dai funghi e disinfettare i tagli. Segnare in estate le piante infette (sintomatiche). Le stesse vanno potate a parte per limitare la diffusione della malattia.

Gli attrezzi di taglio devono essere disinfettati con Sali quaternari di ammonio o con Ipoclorito di sodio.

BLACK ROT (*Guignardia bidwellii*)

Sostanza attiva	Fase	Prodotti commerciali
Pyraclostrobin	D - G	vedi Peronospora / Oidio
Dithianon	C - F	vedi Peronospora
Tetraconazolo	E - G	vedi Oidio
Mefentrifluconazolo	E - G	vedi Oidio
Penconazolo	E - G	vedi Oidio
Difenoconazolo	E - G	vedi Oidio
Trifloxystrobin	E - G	vedi Oidio
Azoxystrobin	C - G	vedi Oidio
Rameici	C - G	vedi Peronospora

PREFERIBILE

ATTENZIONE

USO LIMITATO

Limitazioni d'uso

**TRATTAMENTI
SOLO
A CARATTERE
PREVENTIVO**



INSETTI FITOFAGI

Sostanza attiva	Prodotti commerciali
Feromoni confusione sessuale	ISONET L PLUS
Confusione sessuale con irrorazione a tutta chioma	EXPLOYO VIT-SUBVERT
Bacillus thuringiensis	RAPAX-TUREX-DIPEL-BATKUR-ecc.
Tebufenozide	MIMIC
Metossifenoziide	INTREPID
Clorantranilprole	CORAGEN-VESTICOR
Emamectina benzoato	AFFIRM
Spinetoram	FIDELITY
Sali potassici di acidi grassi	FLIPPER
Azadiractina	OIKOS
Beauveria bassiana	NATURALIS
Piretro naturale	BIOPIREN PLUS-LINCE-ecc.
Spirotetramat	MOVENTO 48 SC
Spinosad	LASER
Acetamiprid	EPIK SL-KESTREL
Sulfoxaflor (3)	CLOSER
Etofenprox (1-2)	TREBON UP
Esfenvalerate (1-2)	SUMIALFA ECHO
Lambda-cialotrina (1-2)	KARATE ZEON-FORZA
Tau-Fluvalinate (1)	MAVRIK SMART - EVURE PRO
Deltametrina (1)	ANTAL-DELTAAGRI-GLORIAL 25 EC
Flupyradifurone	SIVANTO PRIME
Olio minerale	BIOLID UP-POLITHIOL-VERNOIL-ALBENE-ecc.
Olio essenziale di arancio dolce	PREV-AM PLUS - LIMOCIDE

Limitazioni d'uso	n° trattamenti	bio
Tignole		
Tignole	Vedi Etichetta	
Tignole		
Tignole	max 2	
Tignole	max 1	
Tignole	max 1	
Tignole	max 2	
Tignole - Tripidi (revoca 30.12.2025)	max 1	
Cicaline - Tripidi		
Cicaline - Tripidi - Cocciniglia - Tignole		
Cicaline - Tripidi		
Cicaline		
Cocciniglie - Fillossera (revoca 30.10.2025)	max 1 Friuli/2 Veneto	
Tignole - Tripidi	max 3 *	
Cicaline - Cocciniglie-Fillossera...	max 1*	
Cicaline - Cocciniglie	max 1*	
Cicaline	max 1*	
Cicaline	max 1*	
Cicaline	max 1*	
Cicaline - Tripidi	max 1*	
Cicaline	max 2*	
Cicaline - Fillossera-Cocciniglie	max 1*	
Cocciniglie		
Cicaline - Tripidi	forme giovanili	



Tignole (*L. botrana*-*E. ambiguella*): per monitorare i voli utilizzare le trappole a feromoni. Per la I generazione vedere Veneto/Friuli. Intervenire preferibilmente nella II generazione sulla base dei voli degli adulti e della sostanza attiva da impiegare. Per la III generazione intervenire solo nelle varietà tardive (preferibile il *Bacillus huringiensis*). **Cicaline** (*Scaphoideus titanus*-*E. vitis*-*Z. ramni*): intervenire in ottemperanza al DM di lotta obbligatoria contro lo *Scaphoideus titanus* (vettore della Flavescenza dorata) sulle indicazioni del Settore Fitosanitario Regionale.

Cocciniglie (*Targionia vitis*-*Planococcus spp*-*Neopulvinaria innumerabilis*-*Pulvinaria vitis*-*Parthenolecanium vitis*-*Pseudococcus comstocki*): effettuare la scortecciatura e lo spazzolamento dove inizia l'infestazione. Intervenire chimicamente solo sui ceppi infestati. Difesa Biologica: con predatori/ parassitoidi (*Anagyrus vladimiri*, *Cryptolaemus montrouzieri*). Per la *T. vitis* trattare alla fuoriuscita delle neanidi (metà giugno-metà luglio). * Numero trattamenti indipendentemente dall'avversità (leggere sempre l'etichetta del Prodotto Commerciale).

(1) Max 1 e poco selettivi sui Fitoseidi. Max 4 interventi/anno Veneto e max 3 interventi/anno Friuli V.G. con Piretroidi comprese le Piretrine (max 2 contro *Scaphoideus titanus*).

(1-2) Max 1 in alternativa tra loro.

Negli interventi insetticidi attenersi sempre a quanto riportato nei bollettini emessi dai Servizi Fitosanitari Regionali!

(3) Sulfoxaflor: autorizzato dal 01-05-2025 al 28-08-2025 con D.M. del 09-04-2025 per l'uso di emergenza fitosanitaria come da Reg. (UE) 1107/2009, art. 53.

ACARI FITOFAGI (Panonychus ulmi-Eutetranychus carpini)

Sostanza attiva	Prodotti commerciali
Exitiazox	MATACAR-PICKER FLOW-ecc.
Fenpiroximate	DANITRON
Sali potassici di acidi grassi	FLIPPER
Tebufenpirad	SHIRUDO
Beauveria bassiana ATCC 74040	NATURALIS
Acequinocyl	KANEMITE

PREFERIBILE

ATTENZIONE

USO LIMITATO

Limitazioni d'uso annuo	bio
contro questa avversità max 1 trattamento all'anno soglie indicative: 10-15 ragni rossi per foglia e/o 5-6 ragni gialli per foglia	
	
	



Una corretta difesa rispetta i predatori (Fitoseidi) e non rende normalmente necessario intervenire.

Max 1 intervento/anno con acaricidi di sintesi, indipendentemente dall'avversità. E' ammessa la miscela ovicida + adulticida.

Eriofidi-Acariosi (*Calepitrimerus vitis*): intervenire (Olio minerale entro la fase di gemma gonfia, o con Zolfo, o con Maltodestrine, o con Sali potassici di acidi grassi, o con Tebufenpirad) solo in caso di forte attacco all'inizio della ripresa vegetativa e se si è verificata tale presenza nell'annata precedente (max 1 intervento/anno con acaricidi di sintesi).

INFESTANTI

Sostanza attiva %	Infestanti	Prodotti commerciali
Acido Pelargonico	Graminacee e Dicotiledoni	BELOUKHA
Carfentrazone (1)	Graminacee e Dicotiledoni	SPOTLIGHT PLUS
Pendimetalin	Graminacee e Dicotiledoni	STOMP AQUA
Isoxaben	Graminacee e Dicotiledoni	GALLERY
Flzasulfuron (2)	Graminacee e Dicotiledoni	CHIKARA 25 WG
Penoxsulam	Graminacee e Dicotiledoni	LOCK UP
Clomazone	Graminacee e Dicotiledoni	REXXAR
Pyraflufen-ethyle	Graminacee e Dicotiledoni	REVOLUTION-PIRAMAX EC
MCPA	Dicotiledoni	FENOXILENE 200
Ciclossidim	Graminacee	STRATOS ULTRA
Quizalofop-p-etile-Propaquizafop-Cletodim	Graminacee	Diversi
Fluazifop-p-butile	Graminacee	Diversi

**Area dei 15 Comuni
(Conegliano-Valdobbiadene)
che vieta l'impiego della
sostanza GLIFOSATE**



PREFERIBILE

ATTENZIONE

USO LIMITATO

dose max ettaro

utilizzabile anche come spollonante

erbicida e spollonante

max 30% larghezza dell'interfilare

da fine inverno al germogliamento

tra fine inverno e primavera ad anni alterni

solo dal 4° anno di età (marzo/luglio)

erbicida e spollonante

**DISERBO CHIMICO
SCONSIGLIATO !**



Il diserbo deve essere localizzato sulla fila.
L'area trattata non deve superare il 30% dell'intera superficie.

(1) come erbicida max 0,3 l/ha per intervento.
Come spollonante max 0,3 lt per Km percorso.
La dose riportata in tabella è già calcolata in riferimento al diserbo localizzata di un ettaro di vigneto.
Oxifluorfen, Pendimetalin, Propizamide, Diflufenican, max 1 in alternativa tra loro. Diflufenican solo durante il riposo vegetativo.

(2) Non ammesso su terreni sabbiosi.
Seguire attentamente le differenti disposizioni dettate dal Veneto e/o dal Friuli Venezia Giulia!

Il presente documento non contempla l'utilizzo della sostanza Glifosate.

NO DISERBO CHIMICO: CONTROLLO MECCANICO



Minicingolato con trincia laterale rientrante, trincia doppio rientrante e trincia centrale con flagelli laterali rientranti.



Alternative già presenti nei comprensori viticoli: disco motrice, la lama ed il vomere tutti doppi e dotati di tastatori per il rientro automatico e ancora il Rollhacke e il Fingerhacke sempre per la lavorazione meccanica sottochioma.

MECCANICO DELLE INFESTANTI SOTTOCHIOMA



Gli scalzatori (aratrini) rivoltano la zolla e vanno più in profondità permettendo interventi più distanziati nel tempo. A destra trinciapacciamatrice.



Diserbi ad azione fisica come il vapore, l'acqua in pressione, la schiuma vegetale e il pirodiserbo.

FLAVESCENZA DORATA



FD: causata da fitoplasmi (batteri senza parete cellulare)

Sintomi su foglie, tralci e grappoli

Non trasmissibile con i tagli di potatura

I sintomi compaiono l'anno dopo l'inoculo

Principale vettore Scaphoideus titanus

Sverna come uovo e nasce sano

Una generazione/anno (a scalare)

Si infetta fin da giovane e resta infettivo per tutta la vita

Nasce da metà maggio (5 età giovanili)

Adulti da luglio a ottobre

Monitoraggi sulle età dello Scaphoideus nelle foglie e nelle trappole cromotropiche



DELLA VITE di F. Terzariol

Obbligo dell'osservanza del Decreto di Lotta Obbligatoria del Veneto o del Friuli Venezia Giulia, nei tempi e nei prodotti insetticidi indicati e negli interventi agronomici evidenziati!

Trattamenti: tutta la vite e tutti i vigneti, con alti volumi d'acqua (min. 5 HI/Ha)

Contenuta velocità (4-6 Km/h)

Intervenire verso sera, dapprima lungo il perimetro del vigneto, e NO miscele

Spollonare e/o falciare 2-3 giorni prima del trattamento insetticida

Obbligo di ESTIRPO delle viti sintomatiche e delle viti inselvatichite!

Non ammessi vigneti o colture agrarie abbandonate

SQNPI: per chi ha scelto lo sfalcio a file alterne, si ricorda di falciare TUTTO il vigneto prima dell'intervento insetticida



Alla base di una conduzione ambientale sostenibile del vigneto permane la riduzione all'utilizzo dei presidi fitosanitari; per rendere maggiormente applicabile tale percorso risulta fondamentale programmare una gestione del suolo, che garantisca una migliore convivenza tra apparato radicale della pianta e terreno influenzando positivamente la resistenza della vite a patogeni fungini ed avversità.

Lavorazioni annuali in vigna mediante un continuo passaggio di mezzi meccanici lungo i filari, precipitazioni sempre più abbondanti alternate a periodi di siccità, provocano rigonfiamenti e crepacciamenti del terreno, generando la formazione di una suola compatta superficiale che peggiora le condizioni di sviluppo degli organismi tellurici.

Il loro intervento garantisce la presenza di ossigeno nella rizosfera, riduce la presenza di anidride carbonica ed etilene e favorisce il corretto drenaggio dell'acqua. Diversi studi evidenziano che la ricchezza floristica varia all'interno del filare in seguito al compattamento del terreno. Nelle zone stressate si è evidenziata una riduzione in termini quantitativi del 50 % circa di specie, evidenziando una presenza di piante idrofile e nitrofile, antagoniste alla vite.

Si evidenziano poi riduzioni della flora garante della biodiversità utile per la permanenza di fitoseidi ed insetti utili alla vite.

Per proteggere il suolo dal compattamento una delle pratiche impiegabili risulta essere il sovescio a filari alterni.

Dopo una lavorazione superficiale autunnale, l'inerbimento temporaneo e il successivo interrimento (non oltre i 10/20 cm) garantisce una riduzione importante del compattamento.

La scelta della semente da utilizzare risulta di particolare importanza.



TO: LA GESTIONE DEL SUOLO

Le **leguminose** utilizzate per il sovescio sono **Favino**, **Trifoglio Incarnato**, **Veccia Comune**, **Pisello da foraggio**, **Fava** e **Lupino**. Presentano un apparato radicale di tipo fittonante che esplora in profondità il terreno, migliorandone la struttura grossolana. Rompono la suola di lavorazione favorendo la permeazione delle acque in eccesso. Tali specie possiedono la caratteristica di fissare al terreno l'azoto presente nell'aria, grazie alla simbiosi tra apparato radicale e il battere **Rhizobium leguminosarum**.

Le **graminacee**, principalmente **Segale**, **Avena strigosa**, **Loietto italiano**, **Sorgo** e **Orzo**, presentano un apparato radicale di tipo fascicolato, esplorando grandi volumi di terreno ma in superficie, migliorandone la struttura agendo positivamente nei confronti dell'areazione. Aumentano la resa in humus grazie ad un elevato rapporto C/N. Trattenendo una quantità di azoto elevata ne sfavoriscono conseguentemente la lisciviazione; con il loro interrimento primaverile rendono nuovamente disponibile l'azoto trattenuto in precedenza.

Le **crucifere** con il loro apparato radicale fittonante che penetra in profondità, permettono di mantenere soffice il terreno; producono in genere una grande quantità di massa vegetale.

Tra le più comuni vengono impiegate **Senape spp**, **Ravizzone** e **Colza** avendo la capacità di dare vita ad humus stabile.



Fava



Trifoglio incarnato



Segale



Avena strigosa



Loietto



Colza



Prosecco, denominazione, sostenibile

Le tematiche ambientali, etico-sociali ed economiche appartengono alla componente immateriale della Qualità del prodotto, infatti vengono sostenute dal Consorzio con molteplici progetti di ricerca, in particolare per la riduzione degli input chimici e delle emissioni di CO₂, per la corretta gestione della risorsa idrica, per l'incremento della biodiversità, per le buone pratiche verso i dipendenti e le comunità locali, con l'obiettivo di rendere il Prosecco una risorsa durevole nel tempo per tutti i soggetti interessati direttamente e indirettamente. Dato il significativo numero di standard di certificazione di sostenibilità, il Consorzio sta organizzando un percorso inclusivo (identificabile come un'attività di ingegnerizzazione delle informazioni), che coinvolga un numero rilevante di produttori e che definisca il metodo di gestione delle certificazioni individuando il ruolo del Consorzio come "Data Orchestrator".

Il Consorzio, inoltre, sostiene e promuove i progetti, le iniziative e le certificazioni che portano ad un concreto incremento del livello di sostenibilità del Prosecco.



Le buone pratiche viticole



Biodiversità e salute del suolo

- Eliminazione erbicidi
- Lavorazioni minime e superficiali
- Sovesci/selezione delle essenze
- Concimazioni organiche
- Utilizzo microrganismi

Efficienza di irrigazione

- Microirrigazione
- Utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni (bilancio idrico)
- Utilizzo di stazioni meteo e sensoristica di monitoraggio dello stato idrico

Riduzione degli input chimici

- Monitoraggio dello stato fitosanitario del vigneto e valutazione pressione patogena input (link Veneto e Friuli V. G.)

<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/uso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari>
<http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata>

- Utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni
- Utilizzo di biostimolanti e corroboranti
- Calcolo del bilancio dei macro-elementi

Equilibrio vegeto produttivo

- Potatura adeguata al disciplinare
- Scacchiatura e selezione dei germogli
- Palizzamento
- Defogliatura e cimatura in funzione della vigoria e delle condizioni climatiche

La valorizzazione del territorio attraverso le siepi campestri

La siepe è un'importante elemento di valorizzazione per il nostro territorio in quanto arricchisce la biodiversità e l'armonia naturale del paesaggio e funge da barriera di mitigazione (antideriva) delle attività effettuate in vigneto. Pertanto si ritiene opportuno promuovere la realizzazione ed il mantenimento di impianti arborei/arbustivi, al fine di salvaguardare l'equilibrio ecologico, che abbiano i seguenti requisiti:


- 1) altezza superiore di almeno 1 m rispetto alla coltura trattata e di almeno 4 m in caso di utilizzo di attrezzature sprovviste di recupero;
- 2) pienezza della chioma, dalla base alla cima, ottenuta anche lasciando sviluppare le specie erbacee (non infestanti) alla base;
- 3) lunghezza completa, senza interruzioni, lungo tutto il lato dell'apezzamento dove si ritiene opportuno realizzare l'impianto.

Da recenti studi, è stato dimostrato che la presenza di una siepe fitta può diminuire l'effetto deriva anche del 90%.

Studio dello spray drift oltre la siepe

Con siepe rada (linea più scura) passa **1%** del drift.

Con siepe più fitta (linea più chiara) passa **0,1%** del drift.



Fonte: S. Otto, CNR

Realizzazione di una siepe tipo



Di seguito si schematizza quanto previsto dai provvedimenti regionali* ai fini dell'assegnazione delle idoneità a rivendicare Prosecco DOC.

Dimensioni:

- Larghezza: 1 metro di soggetti arborei/arbustivi più fascia inerbita di 1 - 5 metri anche su un solo lato della siepe per il Veneto e di 1 - 3 metri per ciascun lato della siepe per il Friuli Venezia Giulia (la fascia inerbita dell'impianto arboreo/arbustivo non può sovrapporsi alla testata/fasce laterali del vigneto).
- Lunghezza: si considera la lunghezza totale dell'impianto arboreo/arbustivo.

Specie: specie autoctone previste nei provvedimenti regionali ** (almeno 3 specie diverse in Friuli Venezia Giulia; compresenza di specie arboree e arbustive in Veneto)

Portamento: in Veneto presenza sul filare di almeno due delle tipologie tra arbusti/alberi/ceppaia.

Densità di chioma piena tra i diversi soggetti (reciproco contatto) con interassi compresi tra:


- 0,5 - 1,5 m di distanza sulla fila tra due soggetti arbustivi
- 2 - 4 m di distanza sulla fila tra due soggetti a ceppaia
- 4 - 8 m di distanza sulla fila tra due soggetti arborei

Gestione della chioma: i soggetti possono essere potati purché mantengano un portamento naturaliforme, inoltre deve essere:

- garantita la piena densità di chioma attraverso il rinfoltimento aree rade e la sostituzione soggetti deperienti;
- garantita la fascia inerbita che va correttamente gestita (sfalci).

Esempio di impianto realizzato secondo i parametri previsti dai provvedimenti regionali.

Possono essere valutate altre tipologie di impianto (siepe/boschetto) consultando i provvedimenti regionali*




*Regione Veneto: Dgr n. 1560/2017 - Regione Friuli Venezia Giulia: Dgr n. 2105/2017.

** Regione Veneto: Decreto n. 100 del 13/10/2017, Allegato A - Regione Friuli Venezia Giulia: Decreto n. 5612 del 27/10/2017, Allegato 2.

Per quanto riguarda la rivendicazione a Prosecco DOC dei vigneti vincolati dalle condizioni ambientali paesaggistiche (Bando 2017), si ricorda che tutti gli impegni assunti (Bio/Sqnp/siepe/boschetto) devono essere mantenuti anche in caso di modifiche nella conduzione del vigneto, pena la perdita, in via definitiva, dell'idoneità ricevuta.

Piantumare/Seminare le seguenti essenze nettariifere per incrementare, sulla superficie aziendale, le fonti di nutrimento per i pronubi (per posizionamento ottimale, vedi colonna “uso”). Ricordarsi di gestire gli sfalci dell’interfila in coerenza i principi della salvaguardia dei pronubi: non sfalciare durante i periodi di fioritura dell’interfila e del vigneto a meno di interventi insetticidi, nel qual caso, è necessario effettuare lo sfalcio antecedentemente al trattamento (idealmente tra uno e tre giorni prima). Non sfalciare il vigneto nel caso di trattamenti insetticidi, oltre a non rispettare la normativa, danneggia le popolazioni di api ed impollinatori selvatici, trasformando l’effetto benefico della presenza di essenze nettariifere sulla biodiversità in effetto nocivo. Incrementare la presenza di essenze nettariifere nelle aree marginali al vigneto dove possibile.



SPECIE	NOME COMUNE	TIPOLOGIA	PERIODO FIORITURA	USO IN VIGNETO
Catalpa bignonioides	ALBERO DEI SIGARI	Albero	fine primavera	siepe
Buddleja davidi	BUDLEIA	arbusto	estate	siepe
Corbezzolo	CORBEZZOLO	arbusto	primavera	siepe
Robinia pseudoacacia	ROBINIA	albero	primavera	siepe
Rubus ulmifolius	ROVO	Erbacea perenne	estate	siepe
Crataeus Monogyna	BIANCOSPINO	albero	primavera	siepe
Corylus avellana	NOCCIOLO	albero	invernale	siepe
Evodia velutina	ALBERO DEL MIELE	albero	estate	siepe
Lonicera fragrantissima	CAPRIFOGGIO CINESE	arbusto	gennaio marzo	siepe
Symporicarpos rivularis	PIANTA DELLE PERLE	arbusto	fine primavera	siepe
Cornillia emerus	EMERO	arbusto	primavera	siepe
Laurus nobilis	ALLORO	arbusto	primavera	siepe
Syringa vulgaris	LILLA	arbusto	primavera	siepe
Cornus mas	CORNILOLO	arbusto	fine primavera	siepe
Prunus laurocerasus	LAUROCERASO	arbusto	aprile	siepe
Tecoma radicalis	BIGNONIA	arbusto rampicante	estate	siepe
Colutera arborescens	VESCICARIA	arbusto	fine primavera	terreni marginali
Onosma echioides l.	VIPERINA COMUNE	suffrutice	fine primavera	terreni marginali

la salvaguardia dei pronubi



SPECIE	NOME COMUNE	TIPOLOGIA	PERIODO FIORITURA	USO IN VIGNETO
Hissopus officinalis	ISSOPO	suffrutice	estate	terreni marginali
Lavandula angustifolia	SPIGO	suffrutice	meta giugno	terreni marginali
Salvia officinalis	SALVIA	suffrutice	estate	terreni marginali
Satureja montana	SANTOREGGIA MONTANA	suffrutice	agosto e settembre	terreni marginali
Tymus pulegioides	SERPILLO	suffrutice	primavera	terreni marginali
Tymus vulgaris	TIMO MAGGIORE	suffrutice	maggio-luglio	terreni soleggiati
Satureja hortensis	SANTOREGGIA	erbacea annuale	estate	terreni marginali
Chamaecytisus hirsutus	CRISTO IRSUTO	suffrutice	fine primavera	terreni marginali
Borago officinalis	BORRAGINE	erbacea annuale	primavera - estate	interfilare
Brassica napus	COLZA	erbacea annuale	primavera	interfilare
Centaurea cyangus	FIORDALISO	erbacea annuale	primavera - estate	Interfilare terreni marginali
Sisymbrium strictissimum	ERBA CORNACCHIA	erbacea annuale	luglio	Interfilare terreni marginali
Phacelia tanacetifolia	FACELIA	erbacea annuale	primavera - estate	interfilare terreni marginali
Fagopyrum esculentum	GRANO SARACENO	erbacea annuale	estate	terreni marginali
Cynoglossum officinale	ERBA VELLUTINA	erbacea biennale		
Echium italicum	VIPERINA MAGGIORE	erbacea biennale	primavera - estate	
Cirsium oleraceum	CARDO GIALLASTRO	erbacea perenne	estate	
Taraxacum officinale	TARASSACO	erbacea perenne	primavera	interfilare

SPECIE	NOME COMUNE	TIPOLOGIA	PERIODO FIORITURA	USO IN VIGNETO
Lamium	FALSA ORTICA	erbacea perenne	fine primavera	terreni marginali
Marrubium incanum	MARROBIO BIANCO	erbacea perenne	estate	terreni marginali
Mentha aquatica	MENTA ACQUATICA	erbacea perenne	primavera - estate	zone umide
Mentha	MENTA SELVATICA	erbacea perenne	primavera - estate	terreni marginali
Nepeta cataria	ERBA GATTA	erbacea perenne	estate	terreni marginali
Origanum majorana	MAGGIORANA	erbacea perenne	estate	terreni marginali
Salvia pratensis	SALVIA DEI PRATI	erbacea perenne	primavera - estate	terreni marginali
Stachys officinalis	ERBA BETONICA	erbacea perenne	estate	terreni marginali
Onobrychis viciifolia	LUPINELLA	erbacea perenne	primavera - estate	terreni marginali
Trifolium incarnatum	TRIFOGLIO ROSSO	erbacea perenne	primavera	interfilare
Trifoglio pratense	TRIFOGLIO VIOLETTO	erbacea perenne	estate	terreni marginali
Trifolium repens	TRIFOGLIO BIANCO	erbacea perenne	primavera - estate	terreni marginali
Lythrum salicaria	RIPARELLA	erbacea perenne	estate	zone umide
Alcea rosea	MALVAROSA	erbacea perenne	estate	terreni marginali
Malva sylvestris	MALVA COMUNE	erbacea perenne	estate	terreni marginali
Lavandula	LAVANDA	erbacea perenne	estate	Terreni marginali

Molte essenze mellifere sono presenti nei terreni marginali o nell'interfila è importante riconoscerli per non sfalciarli in piena fioritura, es il tarassaco, o sfalciarli per evitare avvelenamenti in caso di trattamenti con insetticidi.

Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari in vicinanza delle aree frequentate dalla popolazione.

CONSIGLI DI BUON VICINATO

Tenuto conto delle peculiarità del nostro territorio, le operazioni viticole, in particolar modo quelle legate alla difesa fitosanitaria, non possono prescindere dal contesto sociale in cui è inserita l'attività produttiva del viticoltore. Premesso ciò e visto i risultati positivi di diverse esperienze, è buona prassi instaurare un rapporto di dialogo costruttivo con la comunità locale, soprattutto con il vicinato e con i soggetti che dovessero transitare nelle aree limitrofe al vigneto. Il vicino, come confermano i risultati dell'indagine realizzata dall'Università di Padova, non è a conoscenza dei prodotti utilizzati durante i trattamenti, pertanto, vuole essere rassicurato almeno dalle informazioni basilari dell'intervento.

Buone pratiche:

- Adeguata cartellonistica (vedi cartello a lato), integrata eventualmente con un riferimento e-mail dell'operatore con cui i residenti confinanti possono interagire per segnalazioni o per essere informati sulle operazioni di trattamento, (ad esempio avvisi preventivi di circa un giorno, con orario e finalità degli interventi di difesa).

- Creazione di barriere antideriva in vicinanza dei punti sensibili, come la creazione di siepi o altri sistemi. Inoltre, come da normativa vigente, si segnala di non lasciare incustoditi recipienti o rifiuti (plastiche, barattoli...) in vigneto.

ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI	
SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE E FINALITA' TRATTAMENTO:	
DATA TRATTAMENTO:	DURATA DIVIETO ACCESSO (GG)

<http://www.piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>

INFORMATIVA PER LA CORRETTA GESTIONE DEL LAVORO STAGIONALE

Con lo scopo di promuovere le buone pratiche circa il reclutamento dei lavoratori stagionali, operato anche tramite cooperativa, di seguito si riportano i documenti da chiedere all'azienda a cui verrà affidata l'attività (es. vendemmia, potatura, etc.), al fine di potersi tutelare dal punto di vista normativo. In particolare, ai sensi dell'articolo 30 del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del lavoro)

- Autocertificazione dei requisiti di idoneità (vedi link n.1)
 - DVR – Documento di Valutazione dei Rischi;
 - DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza;
 - Formazione in merito ai rischi specifici relativi alle attività oggetto del contratto sottoscritto;
 - Formazione sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008);
 - Il CCNL applicato ai lavoratori sia del settore specifico per la mansione;
- Visura CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)
- DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

Questi documenti consentiranno di accertare il rispetto, da parte della ditta appaltatrice, delle normative vigenti relative alla somministrazione del lavoro e alla sicurezza. Inoltre, in caso di stipula di un contratto di appalto, si raccomanda di verificare quanto previsto dai CCPL (Contratto Collettivo Provinciale del Lavoro). Infatti, per alcuni areali della denominazione, potrebbe essere prevista, con apposita comunicazione all'Ente competente, la segnalazione del contratto stipulato. A titolo esemplificativo, si riporta la procedura da adottare per le aziende della provincia di Treviso (vedi link n.2).

Link n.1 (documento di autocertificazione sui requisiti di idoneità tecnico professionale):

<https://docs.google.com/document/d/1ebZ9CXP09HIZxk6EhYVT1P2dxAkch2m0/edit?usp=sharing&oid=112254722763355150144&rtpof=true&sd=true;>

Link n. 2 (segnalazione contratti di appalto)

<https://fiimiebbattreviso.it/contratti-dappalto/#:~:text=Come%20previsto%20dal,la%20data%20certa.>

COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE SULLA REVOCA DELLA REGISTRAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Date Ultimo Impiego

Fiorello Terzariol



Sostanze Attive REVOCATE 2024

CLOFENTEZINE (acari fitofagi) 11 novembre

ABAMECTINA (acari fitofagi) 31 agosto/30 dicembre

METIRAM (peronospora) 28 novembre

BENTIAVALICARB (peronospora) 13 dicembre

Sostanze Attive REVOCATE 2025

DIMETOMORF (peronospora) 20 maggio

MEPANIPYRIM (botrite) 25 maggio

SPIROTETRAMAT (cocciniglia/fillossera) 30 ottobre

SPINETORAM (tignole/tripidi) 30 dicembre

Sostanze Attive REVOCATE 2026 (al 31.03.2025)

FENPYRAZAMINA (botrite) 15 gennaio

MEPTYLDINOCAP (oidio) 30 settembre

Classificazione ed etichette obbligatorie dal 1 giugno 2017

Classificazione CLP (Mondiale) Regolamento (CE) 1272/2008 Classification, Labelling, Packaging



Insetticida **NOME PRODOTTO**

Composizione
100 g di prodotto contengono:
abamectina g 1,71 (18g/l)
chlorantranilprole g 4,29(45 g/l)
g 100

ATTENZIONE **AVVERTENZA**

PITTOGRAMMI

FRASI H
FRASI EUH
FRASI P

INDICAZIONI DI PERICOLO • Nocivo se ingerito. Nocivo se inalato. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA • Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. In caso di inalazione: trasportare l'Infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

CLP



**Consorzio di Tutela della Denominazione
di Origine Controllata Prosecco**

Via Calmaggione, 23 - 31100 TREVISO IT
t +39 0422 1572383 - f +39 0422 1572385
info@consorzio.prosecco.it
www.consorzio.prosecco.it



**CONSORZIO
VINI VENEZIA**

TRE TERRITORI ALL'OMBRA DEL LEONE

Consorzio Vini Venezia

Via Businello, 3 - 31040 PORTOBUFFOLÈ
t +39 0422 850045 - f +39 0422 850253
consorzio@consorziovinivenezia.it
www.consorziovinivenezia.it