

**Comunicato n. 01/25 *Fiorello Terzariol* del 06/04/2025**

**ANDAMENTO DELLA PRIMA FASE VITICOLA 2025**

Dal lato **meteorologico** il primo trimestre **2025** nell'area viticola dei Vini Venezia ha sempre mantenuto un gradiente termico attorno ai 2°C superiore alla media. Se nella scorsa annata si commentava sulle frequenti e abbondanti precipitazioni (429 mm in 34 giorni di pioggia), quest'anno ci sono stati mediamente 166 mm di pioggia in meno, ma con 31 giorni piovosi, che significa aver mantenuto piuttosto bagnato il suolo, con molta attenzione quindi sui potenziali stimoli di maturazione delle oospore della Peronospora!!!

Attenzione all'abbassamento termico di questi giorni!

Dal lato **fenologico** la vite ha iniziato la sua attività vegetativa **2025** con la fase del **pianto** dal 6 al 12 marzo. L'ingrossamento delle gemme si è manifestato in maniera molto difforme a seconda delle aree viticole e comunque evidenziandosi dalla metà di marzo, con l'allungamento vegetativo (2-5 cm nella Glera) verso il 25-27 di marzo nelle **colline** a est della provincia trevigiana (ora con 4-12 cm) e con l'inizio germogliamento per gran parte dell'ambiente vitato di **pianura** in questi ultimissimi giorni.

Nei vigneti che negli ultimi anni hanno sviluppato la presenza del fungo dell'**Escoriosi** (*Phomopsis viticola*), si consiglia di fare attenzione al momento in cui la pianta (a seconda della varietà e delle aree, a questo punto di pianura...), si presenterà fenologicamente allo stadio di "**apertura gemma**" ("gemma gonfia" o "punta verde"), per intervenire adeguatamente e celermente con prodotti a base di Folpet, o con Dithianon+Fosfonato di potassio, o con prodotti Rameici, ripetendo il trattamento dopo 8 – 10 giorni.

In alcuni ambienti, si dovrà invece porre attenzione già al rischio, con una eventuale pioggia, dell'avvio di una ipotetica infezione primaria di Peronospora (vedi ultime foto fenologiche).


Contro l'**Escoriosi** e l'**Oidio** (si consiglia di prendere in considerazione le molteplici attività svolte dalle Strobilurine...), si potrà intervenire utilizzando il Pyraclostrobin o l'Azoxystrobin, se non vincolati da alcune norme sotto riportate (Zolfo ammesso solo come antioidico in SQNPI).

**Attenzione ai divieti sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Vademecum/Protocolli viticoli e alle limitazioni imposte agli aderenti al Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI).**

**Si raccomanda di leggere sempre attentamente, prima dell'utilizzo, le etichette dei formulati commerciali e di rispettarne le indicazioni!**



Collina Coneglianese 05.04.2023–27.03.2024-02.04.2025



Glera Pianura 04 aprile 2025



Glera Coneglianese 02.04.2024 – 5 aprile 2025 (situazione potenzialmente recettiva alla Peronospora!)

