

Comunicato n. 17/25 di Fiorello Terzariol del 23/07/2025

## VITE: INIZIO INVAIATURA DI DIVERSE VARIETA' MEDIO TARDIVE, TRA CUI LA GLERA.

Inizio della seconda metà di luglio con valori termici nella media (24-25°C), piovosità più o meno intense a macchia di leopardo, con qualche puntuale grandinata e forte vento (21 luglio) e umidità che si mantiene mediamente sul 70%:

La **fenologia** nelle diverse cultivar continua ad avanzare (vedi foto), mantenendo un leggero anticipo rispetto alla scorsa annata.

Gli interventi contro la **Peronospora** dovranno proseguire, vista l'insistente presenza del fungo in particolare, e per fortuna, solo nelle ultime foglie e nelle femminelle, con i classici prodotti **Rameici (Idrossidi, Ossicloruri..)** ad intervalli "stretti" se interessati da piogge o nel malaugurato caso di grandinate.

Negli ultimi giorni si confermano riscontri dell'**Oidio**. In questo caso bisognerà intervenire immediatamente con lo **Zolfo in polvere**.

In assenza del fungo e a carattere preventivo, impiegare lo **Zolfo micronizzato**.

Contro la **Botrite** e soprattutto per le varietà a grappolo compatto, in questa fase di **invaiaatura** e dopo i necessari interventi sulla vegetazione per esporre al meglio i grappoli, si consiglia di impiegare un **antibotritico specifico** preferibilmente di origine biologica.

**Tignole**: terminato il volo della seconda generazione, si assiste ora all'inizio della terza.

Presenze sempre maggiori e preoccupanti delle **Cocciniglie** (in particolare Cocciniglia farinosa e Cocciniglia del corniolo), da controllare anche con un eventuale intervento contro lo *Scaphoideus titanus*. Sarà sicuramente un grande problema nella prossima annata, con la revoca di ulteriori insetticidi!

## LOTTA alla FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE 2025 DGR Veneto n. 58 del 14 maggio 2025

Dopo aver ottemperato ai trattamenti obbligatori per il convenzionale e per i vigneti a conduzione biologica e l'estirpo delle piante sintomatiche come riportato nel Decreto di Lotta Obbligatoria alla **Flavescenza dorata 2025**, sulla base dei monitoraggi che si stanno effettuando nel nostro territorio viticolo, che evidenziano talvolta un marginale e limitato riscontro nelle trappole cromotropiche degli adulti di **Scaphoideus titanus**, ma in alcuni casi anche presenze numericamente "importanti", si sottolinea che...

Un eventuale trattamento insetticida (entro fine luglio) sarà giustificato solo:

- per la presenza accertata degli Scafi nelle trappole di monitoraggio aziendali;
- a causa della vicinanza di vigneti abbandonati o con forte presenza di Gialumi;
- ...e quindi, se necessario:
- intervenire con Piretroidi nel convenzionale e con Piretrine nel biologico;
- e attenzione al periodo di carenza degli insetticidi da utilizzare!

Fare sempre **attenzione** a tutto ciò che viene riportato sull'**etichetta** degli agrofarmaci da utilizzare, anche nella loro compatibilità con le altre sostanze, rispettando i **divieti** sull'uso di determinati prodotti riportati nei **Regolamenti comunali di polizia rurale**, o **vietati** dalle **Cantine sociali e/o private di appartenenza**, o sconsigliati/limitati nella certificazione **SQNPI** e nei **Protocolli/Vademecum viticoli**.




*Invaiatura su Chardonnay*



*Inizio invaiatura su Cabernet franc*



*Inizio invaiatura su Glera (Gasparinetti/Bernardi)*



*Peronospora larvata (trattato) su Glera (Terzariol)*